



**hände-
hygiene
schützt
dich & mich**

Nicht jeder Handgriff benötigt Handschuhe.

Wann ist eine **hygienische Händedesinfektion** durchzuführen?



Bei Kontakt zur **intakten Haut** im Rahmen der **Basishygiene**

Bei Tätigkeiten **ohne Kontakt zu potentiell infektiösem Material** (bspw. Impfungen)

In den 5 Momenten der Händehygiene:

Vor dem Patientenkontakt

Vor jeder aseptischen Tätigkeit

Nach Kontakt mit potentiell infektiösem Material

Nach dem Patientenkontakt

Nach Kontakt mit der direkten Umgebung des Patienten

Wann sind zusätzlich **Einmalhandschuhe** zu verwenden?



Bei der Pflege und Behandlung von Patientinnen mit **übertragbaren Krankheiten**

Bei **invasiven** Eingriffen^{1,2}, **Punktionen** und bestimmten **Injektionen**

Bei direktem Kontakt mit **stark kontaminierten Flächen**

Bei Tätigkeiten, bei denen mit Kontakt zu potentiell **infektiösem Material** gerechnet werden muss

Bei **alkohol-UN-empfindlichen Krankheits-
erregern** (bspw. Sporen)

¹Bei invasiven Eingriffen sind sterile Handschuhe zu nutzen. ²Bundesgesundheitsblatt 2016 · 59:1189–1220, DOI 10.1007/s00103-016-2416-6 901405 | 1 | 03.24 | A | NaH



**hände-
hygiene
schützt
dich & mich**

Desinfizieren Sie Ihre Hände, auch unter dem Handschuh!

Wann ist eine **hygienische Händedesinfektion** durchzuführen?



Bei Kontakt zur **intakten Haut** im Rahmen der **Basishygiene**

Bei Tätigkeiten **ohne Kontakt zu potentiell infektiösem Material** (bspw. Impfungen)

In den 5 Momenten der Händehygiene:

Vor dem Patientenkontakt

Vor jeder aseptischen Tätigkeit

Nach Kontakt mit potentiell infektiösem Material

Nach dem Patientenkontakt

Nach Kontakt mit der direkten Umgebung des Patienten

Wann sind zusätzlich **Einmalhandschuhe** zu verwenden?



Bei der Pflege und Behandlung von Patientinnen mit **übertragbaren Krankheiten**

Bei **invasiven** Eingriffen^{1,2}, **Punktionen** und bestimmten **Injektionen**

Bei direktem Kontakt mit **stark kontaminierten Flächen**

Bei Tätigkeiten, bei denen mit Kontakt zu potentiell **infektiösem Material** gerechnet werden muss

Bei **alkohol-UN-empfindlichen Krankheitserregern** (bspw. Sporen)

¹Bei invasiven Eingriffen sind sterile Handschuhe zu nutzen. ²Bundesgesundheitsblatt 2016 · 59:1189-1220, DOI 10.1007/s00103-016-2416-6 901405 | 1 | 03.24 | A | NaH